

Normas para después de una extracción (Multilingüe)

ALEMÁN

EMPFEHLUNGEN NACH DEM ZÄHNE ZIEHEN

- Den Verbandsmuli eine Stunde lang auf die Stelle drücken
- Weder Mundspülung noch Spucken während den folgenden 24 Stunden.
- Essen:
 - Aud der anderen Seite der Zahnintervention
 - Weiche Diät
 - Raumtemperatur
- Nach 24 Stunden Kann man Zahnpüllugen mit Wasser vermisch mit Bikarbonat oder Thymiantee anfangen.
- Nach zwei Tagen, sanftes Bürsten der Wunde.
- Solte es schmerzen, Paracetamol (Gelocatil) nehmen.
- Keine Einnahme von Acetylsalicylsäure (Aspirin) oder entzündungshemmenden Mitteln (Ibuprofen, Diclofenac, Ketoprofen)

ESPAÑOL

NORMAS PARA DESPUÉS DE UNA EXTRACCIÓN DENTARIA

- Apretar la gasa durante una hora
- No enjuagarse ni escupir en 24 h.
- Comer:
 - Por el lado contrario de la extracción
 - Dieta blanda
 - A temperatura ambiente o fría
- A las 24 horas, empezar a enjuagarse con agua y bicarbonato y/o infusiones de tomillo
- A los dos días, cepillado suave de la herida
- En caso de dolor tomar Paracetamol (Gelocatil®).
- No tomar Ac. Acetil salicílico (Aspirina®) ni Antiinflamatorios (Ibuprofeno, Diclofenaco, Naproxeno)

INGLÉS

INSTRUCTIONS AFTER A DENTAL EXTRACTION

- Bite on a gauze pad for an hour
- Do not spit or rinse your mouth in 24 hours
- Eating recommendations:
 - Be careful not to chew on the extraction site.
 - Eat only soft foods.
 - Avoid hot or spicy foods.
- After 24 hours, rinse gently your mouth with bicarbonate of soda and/or thyme tea
- After 48 hours brush gently your teeth including the area where the tooth has been extracted
- To keep pain down take paracetamol (i.e. Gelocatil)
- The following medication should be avoided acetyl salicylic acid (i.e. aspirin) and/or anti-swelling medication such as ibuprophen, diclofenac and/or naproxen.

ÁRABE

إرشادات بعد إخراج الأسنان

- 1- إضغط على قطعة القماش لمدة ساعة
- 2- لا تشطف فمك ولا تقيء في الـ 24 ساعة
- 3- تناول الأكل:
 - من الجانب الآخر من مكان الإخراج
 - وجبات لينة
 - حرارة معتدلة أو باردة
- 4- بعد 24 ساعة، يمكنك غسل فمك بـ الماء مع بيكربونات الصوديوم أو شاي النعنع (Thyme Tea)
- 5- بعد يومين، اغسل أسنانك بلطف
- 6- في حالة الألم، تناول الباراسيتامول (Paracetamol)
- 7- لا تأخذ الأسبرين (Aspirin) أو الأدوية المضادة للالتهاب (Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen)

FRANÇÉS

RECOMMANDATIONS APRÈS L'EXTRACTION D'UNE DENT

- Mordez dans une gaze pendant 1 heure
- Ne crachez pas et ne rincez pas votre bouche pendant 24 h
- Mangez:
 - Du côté opposé à celui de la dent extraite
 - Des nourritures molles n'exigeant pas d'être longuement mâchées
 - Des aliments à température ambiante ou froide et peu épicés
- Après 24 heures, rincez doucement votre bouche avec une solution de bicarbonate de soude et/ou une infusion de thym
- Après 48 heures, brossez vous doucement les dents y compris l'endroit où la dent a été extraite
- En cas de douleur, prenez du Paracetamol (Gelocatil)
- Ne pas prendre d'acide acétylsalicylique (aspirine, Aspro, Aspegic) ni d'anti-inflammatoire (ibuprofene, nurofen, diclofenac, naproxin)

RUMANO

NORME DUPĂ EXTRAȚIA UNÉI MĂSELE

- Apasati pansamentul 1 ora
- Nu trageți si un suipati 24 ore
- Mancare:
 - Dupa extractie
 - Mancare usoara (un dura)
 - Temperatura normal sau rece
- Dupa 24 ore incepeti sa arundati si clatiti cu apa si bicarbonat sau ceai de musetel
- Aupa 2 zile splatii usor rana
- Incas de durere luati Paracetamol (Gelocatil)
- Um luati Ac. Acetil salicilico (Aspirina) nici Antiinflamatori (Ibuprofeno, Diclofenaco, Naproxeno)

HINDÚ

दांत निकालने के बाद के नियम

1. दाँत को निकालने के एक घंटे तक दाँत का दबाव रखें।
2. 24 घंटे तक न चूसे न कुन्ना करें।
3. खाना खाने का तरीका:
 - दाँत निकालने के दूसरे तरफ खानें।
 - उमर बढ़ते खाने को ठंडा रखें।
 - नरम चीजें खाएं।
 - 24 घंटे के बाद दाँत के स्थान पर चूसे न कुन्ना करें।
4. 24 घंटे के बाद दाँत के स्थान पर चूसे न कुन्ना करें।
5. दो दिन के बाद दाँत के स्थान पर चूसे न कुन्ना करें।
6. अगर दर्द हो तो पैरासिटामॉल (Paracetamol) लें।
7. अश्विना या स्ट्रुपेन में खाने की चीजें न लें।

CHINO

拔牙后需注意的事项:

1. 拔牙后一个小时内不要将塞在伤口处的纱布咬紧;
2. 24小时内不能漱口;
3. 吃东西时:
 - 吃软东西;
 - 用没有拔牙的一边咀嚼;
 - 要吃质地较软的食物;
 - 不要吃热食, 可以吃凉或温凉食物;
4. 24小时之后要用水和碳酸氢盐和/或百里香浸液漱口;
5. 两天之后, 可以用牙刷轻轻地刷牙口。

RUSO

ПРОЦЕДУРА ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА

1. Сжимать газ в течение часа
2. Не должен ни ополоснуть рот, ни проглатывать в течение 24 часов
3. Чтобы есть:
 - В противоположной стороне удаления зуба
 - Мягкая диета
 - К комнатной температуре или холодной температуре
4. После 24 часов от удаления зуба, начинать ополаскивать рот с водой и бикарбонатом и/или с настоем тимьяна
5. После двух дней от удаления зуба, чистить мягко рану с зубной щеткой
6. В случае страдания боли, возьмите Парацетамол (Gelocatil)
7. Никогда не возьмите Ацетил-салициловой Кислоты (Аспирин®) ни противовоспалительные средства (Ибупрофен, Диклофенак, Напроксен)

DANÉS

REGLER EFTER EN TANDUDTRÆKNING

1. Pres gazenbind i hullet i 1 time
2. Der ma ikke skylles mund eller spytte i 24 timer
3. Maltider:
 - Man ma ikke tygge/spise iden side. Hver tandudtree kningen har fundet sted.
 - Dietkost
 - Kosten skal være stuetemperatur eller koldere
4. Efter 24 timer skal skylning af munden startes med vand og bicarbonat og/eller timian
5. Efter 2 dage kan særet renses med en blod tandborste
6. Hvis der er smerter kan der tages Paracetamol (Gelocatil)
7. Der ma ikke indtages præparater med acetylsalicylsyre, f. eks aspirin og beller ikke Ibuprofeno, Diclofenaco, Naproxeno

HOLANDES

AANWIJZINGEN NA HET VERWIJDEREN VAN EEN TANO

- Bij voorzichtig op een steriel gaas gedurende één uur.
- Spoog en/of spoel uw mond met geen enkele vloeistof gedurende 24 gor lang
- Eten aanbevelingen:
 - Zorg dat u niet kauwt op de plaats waar de tand is weinig
 - Zorg dat u alleenzachte voedsel eet, waarbij u weinig hoeft te kauwen
 - Vermijd heet en gekruid eten.
- Na 24 uur, spoel voorzichtig uw mond met zuiveringszout en/of hijn thee
- Na 48 uur, poets voorzichtig uw tanden, inclusief de plaats waar de tand is verwijderd
- Om pijn te verlichten, neem paracetamol (i.e. Gelocatil)
- De volgende medicatie zou moeten worden: acetyl salicyl zuur (i.e. aspirine) en/of antizweiling medicate zoals ibuprofen, diclofenac, en/of naproxen.

TAGALO (Filipinas)

PAGKATAPOS UTAN NGIPIN

1. Idin ang gasa sa loob ng isang oras
2. Huwag hugasan odumura sa loob ng 24 oras
3. Sa oras ng pagkain:
 - Sa kabila ng binunutan
 - Pagkain (malambot)
 - Ang temperatura maligamgam o lalagim
4. Pagkatoan o pagkatopas ng 24 oras, hugasan ng tubig o bicarbonato y/ infusiones (tea) tym
5. Pagkaraan ng 2 araw sepihulugan (cepillarín) ng dahandahan (sa pinagbunutan)
6. Pag sumakit uminom ng Paracetamol (Gelocatil)
7. Huwag uminom ng Ac. Acetil salicilico (Aspirina) o Pampahupa ng paga (Ibuprofeno, Diclofenaco, Naproxeno)

Santiago Cano Pérez Médico Odontólogo ID Prof. Asociado UIC
 Enrique Peldez de Loño Médico Estomatólogo IO H Prof. Asociado UIC
 M^o Dolores Gutiérrez Villar Médico Estomatólogo IO F
 Mercedes Villanueva Villanueva Médico de Familia 9 G
 Cristina Gracia Ruiz Médico Estomatólogo ID

GEORGIANO

ბრუნვის შემდეგ უნდა მოხდეს შემდეგი:

1. ჭიბა დაეჭვო გზისთვის ერთი საათის განმავლობაში
2. არ დაეჭვო და არ დაეჭვო 24 საათის განმავლობაში
3. შეეჭვო ჭიბის:
 - მხარის საპირისპირო მხარეს
 - ჭიბის
 - საშუალო ტემპის
4. 24 საათის შემდეგ უნდა შეეჭვო ფიჭოსა და/ან თიხისა
5. 48 საათის შემდეგ უნდა შეეჭვო ფიჭოსა და/ან თიხისა
6. თუ გინდა შეეჭვო ფიჭოსა და/ან თიხისა
7. თუ გინდა შეეჭვო ფიჭოსა და/ან თიხისა

URDÚ (Pakistán)

دانت اداوات کو نکالنے کے بعد کے بارے میں اہم ہدایات

1. دانت کے اداوت کے بعد ایک گھنٹہ تک دانتوں کو دبانے سے گریز کریں۔
2. 24 گھنٹوں کے اندر نہ دھوئیں اور نہ ہی دانتوں کو دھوئیں۔
3. کھانے کے وقت:
 - دانتوں کے برعکس طرف سے کھا لیں۔
 - نرم کھانے لیں۔
 - کھانے کی گرمی سے گریز کریں۔
4. 24 گھنٹوں کے بعد دانتوں کے جگہ پر پانی اور/یا تھیم کے پانی سے دھوئیں۔
5. 48 گھنٹوں کے بعد دانتوں کے جگہ پر دانتوں کی چھوٹی سے دھوئیں۔
6. اگر درد ہو تو پاراسیٹامول (Gelocatil) لیں۔
7. دانتوں کے اداوت کے بعد ایسپرین (Aspirin) یا دواؤں سے گریز کریں۔

Ac. acetil salicilico (aspirina)
Antiinflamatorios (Ibuprofeno, Diclofenaco, Naproxeno)